

ØRESNUDEBILLER

Øresnudebiller eller væksthussnudebiller (*Otiorrhynchus* sp.) angriber planter som rhododendron, azalea og taks m.fl. De voksne biller er ca. 12 mm lange og gråbrune med lyse pletter på bagkroppen. De er mest aktive om natten og gemmer sig om dagen.

Det er derfor lettest at opdage et angreb ved at holde øje med skadesymptomerne, som er et karakteristisk halvmåneformet gnav i bladkanten ("billetklip"). Snudebillens larve gør imidlertid endnu større skade ved sit gnav på rødderne og rodhalsen. Det kan være så ødelæggende, at selv store planter vælter.


NYTTEDYR

Nematoder mod øresnudebiller vandes ud på jorden over rødderne. Nematoderne er mikroskopiske rundorme, der trænger ind i øresnudebillens larve og dræber denne indefra.


Ved behandlinger i haven følges behandlingstidspunkterne i skemaet til højre. Temperaturen i jorden bør være min. 12^o C.



Gnav på blad



Gnav på rodhals



Anvendelse

Væksthus	april	oktober
Vindueskarm	hele året	
Udestue	hele året	
Have	maj	juni august september



Nyttedyrsbestilling

"Nematoder mod øresnudebiller" kan bestilles her i butikken. Henvend Dem ved kassen angående bestillingskupon og betaling. Nyttedyrene modtager De med posten som regel dagen efter.